

# Experiência de vida real de uso do tenofovir alafenamida (TAF) no tratamento da hepatite crônica B



Patrícia Lofêgo Gonçalves<sup>1</sup>, Ana Tereza Ramos P. Mendonça<sup>1</sup>, Clara Gonçalves Ruschi<sup>2</sup>, Fausto Edmundo Lima Pereira<sup>3</sup>.

1-Hosp.Univ. Cassiano Antônio de Moraes (HUCAM),UFES; 2-EMESCAM; 3 UVV.

**Introdução:** O TAF é um análogo alternativo para tratamento da hepatite crônica B reservado para situações em que não for possível usar o fumarato de tenofovir desoproxila (TDF) ou entecavir (ETV). Apresenta menor risco de nefrotoxicidade e alterações ósseas. Segundo o PCDT Hepatite B<sup>1</sup> está indicado para cirróticos Child A com uso prévio de lamivudina (LAM); pacientes com alterações renais ou ósseas e uso prévio LAM.

**Objetivo:** relatar a experiência de vida real do uso de TAF.

**Método:** análise retrospectiva de uma série de casos de hepatite crônica B tratados com TAF em amb. de referência de hepatite B (HUCAM), de acordo com as indicações do PCDT.

**Resultado:** 9 pacientes em tratamento com TAF.

sexo: 5 masc. e 4 fem. ; média idade: 68,2 anos (49 a 76 anos).  
4 com cirrose Child A.

Todos tratados previamente com LAM; 7 uso prévio de adefovir.

Indicação TAF : disfunção renal e uso prévio de LAM : 7 (77,7%)  
osteoporose e uso prévio de LAM : 2 ( 22,2%)

Disfunção renal associada ao TDF

- 3 pacientes : ClCr 30-40 ml/min
- 3 pacientes : ClCr 40-50 ml/min
- 1 paciente : ClCr 50-60 ml/min

Melhora do ClCr em todos pacientes após troca para TAF, exceto em um paciente com DRC e Tx renal.

Carga viral: indetectável com TAF em todos os pacientes.

Não observamos efeitos adversos atribuídos ao TAF.

**Conclusão:** O TAF é uma alternativa segura e eficaz para tratamento da hepatite crônica B. A principal indicação foi disfunção renal com uso prévio de LAM. Todos os pacientes evoluíram com melhora do ClCr, exceto um com DRC. A carga viral se manteve indetectável. Não foram observados efeitos adversos relacionados ao uso do TAF.

**Referências :** 1-Brasil.Ministério Saúde,2013.Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Hepatite B e coinfeções. 2- Su PY et al. Real world experience of switching from tenofovir disoproxil fumarate to tenofovir alafenamide in patients with chronic hepatitis B: a retrospective study. PeerJ. 2021; 9:e12527. 3- Karasahin O et al. Real-life Data for Tenofovir Alafenamide Fumarate Treatment of Hepatitis B: the Pythagoras Cohort.Hepat Mon. 2021 ; 21(2):e104943.